

Boletim Epidemiológico


HEPATITE A EM PORTUGAL

Situação a **22 de maio de 2017**: Semana 20 (15 – 21 maio 2017)

Fonte: Direção-Geral da Saúde e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA)

Distribuição geográfica dos casos notificados




(n=285)



285 casos notificados desde 1/1/2017, dos quais:


- 93% em homens
- 56% adquiridos através do contacto sexual
- 26% adquiridos por via desconhecida
- 80% na região Lisboa e Vale do Tejo

144 casos confirmados pelo INSA - estirpe VRD_521_2016




*O grupo etário 18-50 anos destaca-se por ser o grupo mais afetado pela estirpe VRD_521_2016.

Casos notificados por ARS
(n=285)



Casos notificados por sexo
(n=285)



Medidas de Saúde Pública implementadas

- Constituído *stockpile* nacional de vacinas, em março de 2017, requisitado pelo Ministério da Saúde
- Definida a administração gratuita das vacinas a grupos elegíveis, em locais designados
- Publicada [Norma 003/2017](#) de 9 de abril e criada [área "Hepatite A"](#)
- Validados pela DGS 700 pedidos de vacinação para viajantes (média 30/dia, 60% autorizados) até 11/5
- Publicado [Comunicado](#) a 17 de maio que altera o ponto n.º 5 da Norma 003/2017, de 9 de abril, permitindo temporariamente a vacinação de viajantes com prescrição médica sem necessidade de validação pela DGS
- Esclarecimento telefónico a profissionais de saúde e cidadãos
- Vacinação em Portugal - 1486 vacinas administradas desde 3 de abril de 2017 (média 41/dia, incluindo campanhas), das quais 93% na região LVT, a quase totalidade em contexto de pré-exposição e 2% em pós-exposição.
 - Unidade Móvel de vacinação (campanha em Lisboa, Bairro Alto)
 - ◊ 27, 28 e 29 de abril - 150 vacinados
 - ◊ 5 e 6 de maio - 164 vacinados

Medidas de Saúde Pública a implementar nos próximos eventos de massa

Arraial Pride Lisboa, Festivais de verão e WorldPride Madrid 2017

- Antes do evento: reforço da vacinação
- Durante o evento: adoção de medidas de prevenção da hepatite A - higiene pessoal, com particular ênfase na lavagem frequente das mãos, região genital e perianal, antes e após a relação sexual
- Após o evento: vigilância de sintomas compatíveis com hepatite A

A investigação epidemiológica e laboratorial dos casos prossegue e a informação será atualizada em conformidade.