



# Resposta sazonal em saúde

## Vigilância e monitorização

23 de maio de 2024

---

### FICHA TÉCNICA

Ministério da Saúde | Direção-Geral da Saúde  
Relatório de Resposta Sazonal em Saúde — Vigilância e Monitorização  
Relatório n.º 76 | Lisboa: maio, 2024

## RESUMO

### SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

- Na semana em análise (semana 20 de 2024), observou-se uma **descida** da temperatura do ar, com **valores abaixo do esperado** para a época. Prevê-se uma **subida** da temperatura do ar na **semana seguinte** à semana em análise, a nível nacional. Foi reportado ainda um índice global da **qualidade do ar muito bom** ou **bom** na maioria das estações, e um **risco elevado** de exposição à **radiação ultravioleta (UV)**, para todo o país.
- Os casos de **doenças transmitidas por mosquitos** notificados no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica foram **casos importados**.
- A notificação de casos de **infecção por SARS-CoV-2 estabilizou**. A linhagem **BA.2.86** tornou-se **dominante** na semana 44 de 2023, sobretudo devido à sublinhagem JN.1, correspondendo a **87,9%** (semanas 15-18 de 2024).
- No âmbito do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, foi reportada uma **atividade gripal não epidémica**.
- Na UE/EEE, na semana 19 de 2024, a atividade de **infecções respiratórias** manteve-se em **níveis basais**. A atividade do vírus **SARS-CoV-2** e a infecção por vírus sincicial respiratório (**VSR**) mantiveram-se **reduzidas**.
- Na semana em análise, a **procura do SNS24 aumentou**, acompanhada de uma **diminuição** dos atendimentos triados por “**queimaduras**”, por “**exposição solar**”, e por “**náuseas e vômitos**”. A procura do **INEM diminuiu**.
- Face à semana anterior, o **número de consultas médicas nos Cuidados de Saúde Primários** do Serviço Nacional de Saúde **diminuiu**, assim como a proporção de consultas por **desidratação**. As proporções de consultas por **infecções respiratórias agudas** e por **gastroenterite aumentaram**.
- Face à semana anterior, o número de **episódios de urgência hospitalar diminuiu**, acompanhado de uma **diminuição** da proporção de episódios de urgência por **desidratação** e um **aumento** da proporção de episódios por **infecções respiratórias agudas**, e por **vómito, diarreia ou gastroenterite aguda**. A proporção destes com destino internamento **diminuiu**.
- A **mortalidade geral** esteve **de acordo com o esperado** ao nível nacional. A **mortalidade específica por COVID-19** apresentou uma tendência **estável**, encontrando-se **abaixo do limiar do ECDC**.

### RECOMENDAÇÕES


- A análise sustenta a adoção de medidas de proteção, incluindo **evitar exposição ao sol** entre as 11h e as 17h, aplicar **protetor solar**, utilizar **óculos de sol com filtro UV**, procurar **locais à sombra e climatizados** e utilizar **roupas frescas** que **cubram o corpo**.
- **Informar-se** quanto às **previsões meteorológicas** e seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Mais informação pode ser consultada [aqui](#).
- Reforça-se a necessidade de **utilização da Linha SNS24 como primeiro ponto de contacto** com o sistema de saúde. Em caso de **emergência**, ligar **112**.



## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

### TEMPERATURA DO AR

Na semana 20 de 2024 (semana em análise), observou-se uma **descida** da temperatura, constatando-se **valores médios semanais de temperatura máxima, média e mínima do ar em Portugal Continental abaixo do esperado** para esta época do ano. Prevê-se uma **subida** da média da temperatura do ar na semana seguinte à semana em análise para todo o território, **acima do esperado** para esta época do ano.




**FIGURA 1.** Evolução diária das temperaturas mínimas, médias e máximas do ar em Portugal Continental | Fonte: IPMA. Autoria: IPMA

### ÍNDICE ÍCARO

No **Boletim ÍCARO**, foram reportados valores do **Índice-ÍCARO nacional** correspondentes a um **efeito nulo** na mortalidade durante a semana em análise. A 23/05/2024, o valor do **Índice-ÍCARO** para Portugal Continental é de **0**, correspondente a um **efeito nulo** sobre a mortalidade, nos próximos 3 dias (figura 2).

**FIGURA 2.** Evolução dos valores do Índice-ÍCARO (II) em Portugal Continental, para a população geral e a população com 75 ou mais anos, dos últimos 28 dias e os valores previstos para 3 dias (d, d+1, d+2) | Fonte: INSA, IPMA. Autoria: INSA, IPMA



### QUALIDADE DO AR E EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Conforme os dados preliminares da Agência Portuguesa do Ambiente, a **qualidade do ar exterior** apresentou um índice global classificado como **muito bom** e **bom** nas estações com informação disponível, com **exceção** de algumas estações nas regiões do **Norte**, do **Centro** e de **Lisboa e Vale do Tejo**.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se um **risco elevado** de **exposição à radiação ultravioleta (UV)**, para todo o país.



## VIGILÂNCIA BASEADA EM EVENTOS

### AVISOS METEOROLÓGICOS PARA TEMPO QUENTE

Sem avisos a destacar.

### ALERTAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS RELEVANTES

De acordo com a mais recente informação do [ECDC](#), na semana 19 de 2024, a **atividade dos vírus respiratórios manteve a tendência decrescente**, em **níveis de base**, na maioria dos países da UE/EEE.

A **atividade gripal** continuou **estável, em níveis baixos**, em quase todos os países da EU/EEE; o vírus da **gripe tipo B** foi identificado em **92%** das deteções, embora o número de deteções permaneça baixo e continue a diminuir.

A atividade do vírus **SARS-CoV-2** manteve-se **reduzida**, embora em alguns países se tenha verificado um ligeiro aumento, de níveis muito baixos. A BA.2.86 apresentou **proporção de 95%** nas semanas 17 e 18/2024; estas estimativas devem ser interpretadas com cautela, uma vez que se baseiam em dados de apenas 2 países, resultado do número muito baixo de sequências depositadas nas últimas semanas durante um período de baixa transmissão de SARS-CoV-2.

A atividade do **VSR manteve-se em níveis reduzidos**, em todos os países que reportaram.

Na semana 19 de 2024, as estimativas agrupadas da [EuroMOMO](#) mostram **níveis normais de excesso de mortalidade**.

A [WHO](#) atualizou a informação sobre o **surto de dengue em São Tomé e Príncipe**, ativo desde abril de 2022. Entre 12/04/2022 e 22/04/2024, foram reportados 18.917 casos suspeitos, incluindo **1.249 casos confirmados**, em todos os distritos de saúde, sendo o distrito de Água Grande o mais afetado (68,2%). Dos 1.249 casos confirmados, 148 (11,8%) foram hospitalizados, dos quais 39 (26,4%) apresentavam sinais hemorrágicos. Foram registados 11 óbitos até à data. De acordo com a avaliação da [WHO](#), as condições climatéricas, com o aumento e intensidade das chuvas, potenciaram as condições para a proliferação de mosquitos e vetores de doenças como a dengue.

### DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS

A informação reportada pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) relativa à disponibilidade de medicamentos foi integrada na análise de risco semanal. A **gestão da disponibilidade de medicamentos**, incluindo a pesquisa de medicamentos em rutura, pode ser consultada a partir de: <https://www.infarmed.pt/web/infarmed/gestao-da-disponibilidade-do-medicamento>.



## VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

### DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

Todos os casos de **doenças transmitidas por mosquitos exóticos e/ou invasores**, notificados na semana em análise, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), com a investigação epidemiológica concluída, foram classificados como **casos importados**.

### COVID-19, GRIPE E OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS


Na semana 20 de 2024, verificou-se um **aumento** de **novos casos notificados a sete dias de infecção por SARS-CoV-2/ COVID-19** (4 casos por 100 000 habitantes; **+100,0%** em relação à semana anterior).

Os dados mais recentes da **diversidade genética do vírus SARS-CoV-2** correspondem aos que estão disponíveis no último relatório publicado. A sub-linhagem **BA.2.86** (descendente da linhagem BA.2) é dominante em Portugal desde a semana 44 de 2023, apresentando uma frequência relativa de **87,9%** entre as **semanas 15 de 2024 e 18 de 2024**, sobretudo devido à **sub-linhagem JN.1** e descendentes.

Com base nas amostras laboratoriais analisadas, a **linhagem recombinante XBB** (e suas descendentes) foi **dominante** em Portugal desde a semana 10 de 2023 até à semana 43 de 2023, registando uma tendência decrescente desde então. **Na última amostragem** (semanas 15 de 2024 a 18 de 2024), foram detetadas **três sequências desta linhagem**.

A maioria das linhagens detetadas na última amostragem apresentam um perfil mutacional semelhante na Spike (“BA.2.86-like”), o qual é consideravelmente divergente da linhagem anteriormente dominante (XBB). Este perfil confere-lhes maior capacidade de **fuga ao sistema imunitário**, e, potencialmente, **maior transmissibilidade**.

Mais informação: [Relatório da Diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 \(COVID-19\) em Portugal](#)




**FIGURA 3.** Evolução da frequência relativa semanal das variantes de SARS- CoV-2 em circulação em Portugal entre as semanas ISO 22-2021 (31/05/2021 a 06/06/2021) e ISO 18-2024 (29/04/2024 a 05/05/2024) | Fonte: INSA. Autoria: INSA

No âmbito da vigilância da **gripe e outros vírus respiratórios**, que se mantém na época de verão, foi reportada uma **atividade não epidémica da gripe** pelo INSA. A última informação partilhada pode ser consultada a partir do [Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e Outros Vírus Respiratórios](#).



## ATENDIMENTOS TRIADOS SNS24 | TOTAL E POR ALGORITMO


Na semana 20 de 2024, o número total de atendimentos triados pela Linha SNS24 **aumentou** (62 438 atendimentos semanais; +2,6% em relação à semana anterior).



**FIGURA 4.** Número de atendimentos triados pela Linha SNS24 (total), semanal, desde a semana 21 de 2022 | Fonte: SPMS – Linha SNS24.


**Nota:** A comparação com valores anteriores à semana 10 de 2024 deve ser realizada com cuidado, considerando a implementação do projeto “Ligue Antes, Salve Vidas” a mais Unidades Locais de Saúde, a partir dessa semana, com apresentação de valores globais de atendimentos triados mais elevados.

Na semana 20 de 2024, o número total de atendimentos semanais por queimaduras **diminuiu** (64 atendimentos; -7,2% em relação à semana anterior), e por **exposição solar diminuiu** (14 atendimentos; -30,0% em relação à semana anterior).




**FIGURA 5.** Número de atendimentos triados pela Linha SNS24 (queimaduras e exposição ao sol), semanal, desde a semana 21 de 2022 | Fonte: SPMS – Linha SNS24.

Na semana 20 de 2024, a **proporção do número total de atendimentos semanais por náuseas e vômitos diminuiu (4,2%; -0,2 pontos percentuais** em relação à semana anterior).



**FIGURA 6.** Proporção do número de atendimentos triados pela Linha SNS24 (náuseas e vômitos), semanal, desde a semana 21 de 2022 | Fonte: SPMS – Linha SNS24.

Na semana 20 de 2024, o **número de atendimentos semanais** pelos algoritmos "Calor", "Queimaduras", "Exposição Solar" e "Náuseas e Vômitos" com encaminhamento para "Autocuidados"  **aumentou (1 562 atendimentos; +0,5%** em relação à semana anterior), com encaminhamento para os "Cuidados de Saúde Primários"  **aumentou (560 atendimentos; +2,8%** em relação à semana anterior), com encaminhamento para o "Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)"  **diminuiu (55 atendimentos; -20,3%** em relação à semana anterior), e com encaminhamento para "Serviço de Urgência"  **diminuiu (2 021 atendimentos; -0,1%** em relação à semana anterior).




**FIGURA 7.** Número de atendimentos triados pela Linha SNS24 (tipo de encaminhamento), semanal, desde a semana 21 de 2022 | Fonte: SPMS – Linha SNS24.



## INEM | CHAMADAS, OCORRÊNCIAS E ACIONAMENTOS


Na semana 20 de 2024, observou-se uma **diminuição** do número de **chamadas semanais** (27 173 chamadas; -9,4% em relação à semana anterior), uma **diminuição** do número de **ocorrências semanais** (26 378 ocorrências; -8,5% em relação à semana anterior) e uma **diminuição** do número de **acionamentos dos meios de emergência médica semanais** (26 231 acionamentos; -8,0% em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2024-05-19  
Fonte: INEM | Autoria: DGS

**FIGURA 8.** Número de chamadas, ocorrências e acionamentos dos meios de emergência semanais, desde a semana 40 de 2022 | Fonte: INEM. Autoria: DGS.

Na semana 20 de 2024, observou-se uma **estabilização** da proporção de ocorrências com prioridade 1 "emergente" (2 655 ocorrências; 10,1%; +0,0 pontos percentuais em relação à semana anterior), um **aumento** da proporção de ocorrências com prioridade 3 "urgente" (20 688 ocorrências; 78,4%; +0,1 pontos percentuais em relação à semana anterior), uma **diminuição** da proporção de ocorrências com prioridade 5 "não urgente" (1 461 ocorrências; 5,5%; -0,2 pontos percentuais em relação à semana anterior), e um **aumento** da proporção de ocorrências com outras prioridades "não urgentes" (1 574 ocorrências; 6,0%; +0,1 pontos percentuais em relação à semana anterior).




Últimos dados: 2024-05-19  
Fonte: INEM | Autoria: DGS

**FIGURA 9.** Número de ocorrências semanais por prioridade da ocorrência, desde a semana 40 de 2022 | Fonte: INEM. Autoria: DGS.



## CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS | TOTAL, CONSULTAS POR INFEÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA, E CONSULTAS POR GASTROENTERITE

Na semana 20 de 2024, verificou-se uma **diminuição** do número total de **consultas médicas nos Cuidados de Saúde Primários** do Serviço Nacional de Saúde (**718 805 consultas, -3,3%** em relação à semana anterior) e um **aumento** da **proporção de consultas por infeção respiratória aguda** (**4,2%; +0,1 pontos percentuais** em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2024-05-19  
 Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 10.** Total de consultas semanais em CSP e proporção de consultas por infeções respiratórias agudas (inclui os códigos ICPC-2: R29\_01; A77\_01; R71; R72, R73, R74; R75; R77; R78; R79; R80; R81; R82; R83 e R99), em Portugal Continental, de 03/05/2021 a 19/05/2024 | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS. Autoria: DGS.

Na semana 20 de 2024, verificou-se um **aumento** da proporção de **consultas semanais por gastroenterite** (**0,7%; +0,04 pontos percentuais** em relação à semana anterior).




Últimos dados: 2024-05-19  
 Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 11.** Proporção de consultas semanais em CSP por gastroenterite (inclui os códigos ICPC-2: D70; D73), em Portugal Continental, de 02/05/2022 a 19/05/2024 | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS. Autoria: DGS.



## CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS | CONSULTAS POR DESIDRATAÇÃO

Na semana 20 de 2024, verificou-se uma **diminuição** da proporção de **consultas semanais por desidratação** (**0,0%**; **-0,00044 pontos percentuais** em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2024-05-19  
 Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS | Autoria: DGS


**FIGURA 12.** Proporção de consultas semanais em CSP por desidratação (inclui o código ICPC-2: T11), em Portugal Continental, de 02/05/2022 a 19/05/2024 | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS. Autoria: DGS

**Nota:** A informação referente aos Cuidados de Saúde Primários deve ser considerada provisória, devido ao processo de migração de dados em curso entre plataformas de informação.



## EPISÓDIOS DE URGÊNCIA | TOTAL, EPISÓDIOS POR INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS E EPISÓDIOS POR VÔMITO, DIARREIA OU GASTROENTERITE AGUDA


Na semana 20 de 2024, verificou-se uma **diminuição** do número total de **episódios de urgência hospitalar (127 667 episódios; -5,8%** em relação à semana anterior) e um **aumento** da **proporção de episódios de urgência por infecção respiratória aguda (7,5%; +0,2 pontos percentuais** em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2024-05-19  
 Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 13.** Número total de episódios de urgência, por semana, e proporção de episódios de urgência por infecção respiratória aguda, em Portugal Continental, de 02/05/2022 a 19/05/2024 | Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS. Autoria: DGS.

Na semana 20 de 2024, verificou-se um **aumento** da proporção de **episódios de urgência por vômito, diarreia ou gastroenterite aguda (4,3%; +0,1 pontos percentuais** em relação à semana anterior).




Últimos dados: 2024-05-19  
 Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 14.** Número total de episódios de urgência por semana, e proporção de episódios por vômito, diarreia ou gastroenterite aguda, em Portugal Continental, de 02/05/2022 a 19/05/2024 | Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS; Autoria: DGS.



## EPISÓDIOS DE URGÊNCIA | TOTAL, POR DESIDRATAÇÃO E COM DESTINO O INTERNAMENTO


Na semana 20 de 2024, verificou-se uma **diminuição** da proporção de **episódios de urgência por desidratação** (**0,1%**; **-0,014 pontos percentuais** em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2024-05-19  
 Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 15.** Número total de episódios de urgência, por semana, e proporção de episódios por desidratação, em Portugal Continental, de 02/05/2022 a 19/05/2024 | Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS; Autoria: DGS

Na semana 20 de 2024, verificou-se uma **diminuição** da proporção de **episódios de urgência com destino o internamento** (**6,9%**; **-0,4 pontos percentuais** em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2024-05-19  
 Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS


**FIGURA 16.** Número total de episódios de urgência, por semana, e proporção de episódios com destino o internamento, em Portugal Continental, de 02/05/2022 a 19/05/2024 | Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS; Autoria: DGS




## OCUPAÇÃO UCI E ENFERMARIAS | POR TODAS AS CAUSAS

Na semana 20 de 2024, a nível nacional, observou-se um **aumento** da média móvel a sete dias da **ocupação de camas em enfermaria por todas as causas (80,5%)** e uma **diminuição** da média móvel a sete dias da **ocupação de camas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por todas as causas (68,3%)**.

A.



B.




**FIGURA 17.** Ocupação hospitalar, por todas as causas, em A. Enfermarias e B. Unidades de Cuidados Intensivos, em Portugal Continental, diária, de 01/09/2022 a 19/05/2024 | Fonte: BI Hospitalar/SDM – ACSS. Autoria: DGS



## MORTALIDADE | POR TODAS AS CAUSAS

Na semana 20 de 2024, foram emitidos **2 082 certificados de óbito**. A mortalidade geral em Portugal esteve **de acordo com o esperado**.




Dados até 2024-05-19 atualizados a 2024-05-22  
 Fonte: SICO/DGS | Autoria: INSA

**FIGURA 18.** Evolução da mortalidade por todas as causas, semanal, entre 02/03/2020 e 19/05/2024. Nota: A linha azul corresponde à mortalidade observada, a linha preta à linha de base e as linhas a tracejado a desvios de 2, 4, 6 e 8 z-scores da linha de base. A área a sombreado corresponde ao corredor de valores esperados para a época do ano. | Fonte: SICO-DGS; Autoria: INSA.



## MORTALIDADE | COVID-19

Na semana 20 de 2024, a mortalidade específica por **COVID-19** apresentou uma **tendência estável**, encontrando-se **abaixo** do **limiar recomendado pelo ECDC** (20 óbitos devido à COVID-19 a 14 dias por milhão de habitantes).



**FIGURA 19.** Mortalidade por COVID-19 (acumulada a 14 dias e a 7 dias por 1 000 000 habitantes) até 19/05/2024, Portugal | Fonte: SICO-DGS. Autoria: DGS.

## NOTA METODOLÓGICA

### Temperatura do ar

Os valores de temperatura do ar são obtidos a partir do Instituto Português do Mar e Atmosfera, IP (IPMA). É apresentada a evolução diária e semanal dos valores médios de temperatura máxima, média e mínima do ar em Portugal Continental, nos últimos três meses, com base nas observações automáticas em cerca de 90 estações meteorológicas, comparativamente com os valores médios mensais no período 1971-2000.

### Índice ÍCARO

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (INSA) publica diariamente o Boletim ÍCARO, que inclui o efeito do calor na mortalidade (previsão do Índice ÍCARO para Portugal Continental) e apresenta os Índices ÍCARO calculados para o dia anterior (d-1), para o próprio dia (d) e para os 2 dias seguintes (d+1 e d+2). O Índice-ÍCARO é um indicador do efeito das temperaturas previstas para o próprio dia (d) e os dois dias seguintes (d+1 e d+2) na mortalidade da população de Portugal Continental. Corresponde à razão entre o número de óbitos previsto, tendo em conta as temperaturas observadas e previstas, e o número de óbitos esperado sem o efeito do calor (Risco Relativo), menos 1. Pode ser assim interpretado como um excesso relativo de risco (RR-1). Este indicador é calculado para Portugal Continental, as cinco regiões de saúde do Continente, a população geral e a população com 75 e mais anos de idade, podendo ser comparado entre os estratos.

O documento de apoio encontra-se disponível [aqui](#).

### Índice ultravioleta

O Índice ultravioleta (UV) é obtido a partir do IPMA, e corresponde a uma medida dos níveis da radiação solar ultravioleta que efetivamente contribui para a formação de uma queimadura na pele humana (eritema), sendo que a sua formação depende dos tipos de pele (I, II, III, IV) e do tempo máximo de exposição solar com a pele desprotegida. Exprime-se numericamente como o resultado da multiplicação do valor médio no tempo da irradiância efetiva (W/m<sup>2</sup>) por 40. Exemplo: Uma irradiância efetiva de 0.2 W/m<sup>2</sup> corresponde a um valor do UVI de 8.0.

O Índice UV varia entre menor que 2, em que o UV é baixo, 3 a 5, Moderado, 6 a 7, Alto, 8 a 9, Muito Alto e superior a 11 Extremo. Os valores médios do UV para a latitude de Portugal, enquadram-se para o período compreendido entre os meses de outubro e abril entre 3 e 6, o que significa moderado com possibilidade de Alto em alguns momentos deste período e entre 9 e 10 para o período compreendido entre Maio e Setembro, o que corresponde a Muito Alto.

Guia de utilização disponível aqui:

<https://www.ipma.pt/bin/docs/institucionais/guia-uv-2019.pdf>

### Qualidade do ar

O índice de qualidade do ar da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) permite de uma forma fácil e compreensível o conhecimento do estado da qualidade do ar e face aos seus resultados, adequar comportamentos e ações no sentido da proteção da saúde humana, especialmente dos grupos mais sensíveis da população. O índice QualAr constitui uma classificação baseada nas concentrações de poluentes registadas nas estações de monitorização e representa a pior classificação obtida, traduzida numa escala de cores divididas em cinco classes, de "Muito Bom" a "Mau".

Método de cálculo dos índices disponível aqui:

<https://qualar.apambiente.pt/node/metodo-calculo-indices>

### Vigilância baseada em eventos

A informação utilizada neste relatório resulta do processo de monitorização de eventos do Centro de Emergências em Saúde Pública da Direção-Geral da Saúde (DGS), através de fontes de informação abertas, plataformas de alertas nacionais e internacionais e redes de pontos focais, incluindo a rede de Autoridades de Saúde.

É integrada ainda informação relevante para a análise de risco das entidades que constituem a Equipa de Monitorização e Intervenção na Resposta Sazonal em Saúde, incluindo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) e informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

### Vigilância de doenças transmissíveis

#### Doenças transmitidas por vetores

A informação sobre espécies de mosquitos exóticos e/ou invasores, e amostras positivas para agentes patogénicos tem como fonte o Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Canbournac do INSA.

A fonte para os casos de doenças transmitidas por vetores, incluindo os mosquitos, corresponde à plataforma informática de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), após investigação epidemiológica realizada pelas Autoridades de Saúde.

### COVID-19

As fontes de dados para o cálculo da incidência cumulativa a 7 dias correspondem ao SINAVE, coordenado pela DGS, e ao Instituto Nacional de Estatística (INE). Este indicador resulta do quociente entre o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 notificados no período em análise (numerador) e a população residente em Portugal, estimada a 31 de dezembro de 2020 (denominador) pelo INE, em Portugal. Cada caso é alocado por data de diagnóstico. A partir de 18/05/2022 a contagem dos casos passou a incluir as suspeitas de reinfeção, com efeito retroativo (i.e., aplicado à contabilização relativa a datas anteriores). A variação semanal da incidência é a diferença entre o valor apresentado e o valor apresentado na semana anterior, em percentagem.

Em Portugal, a monitorização da frequência e dispersão geotemporal das variantes de SARS-CoV-2 é levada a cabo, sob coordenação do INSA, através da sequenciação total do genoma viral em amostragens aleatórias de âmbito nacional. Em determinadas fases da pandemia, os procedimentos laboratoriais de sequenciação tiveram o apoio de membros do consórcio GenomePT. A técnica de sequenciação é a abordagem mais específica e robusta para identificação de variantes, sendo a recomendada pelas autoridades internacionais de Saúde. Em determinados contextos (p.ex., quando da entrada em circulação de novas variantes) tem sido possível utilizar outras abordagens em paralelo, nomeadamente: i) Pesquisa dirigida (por PCR) de mutações, ou combinações de mutações. Trata-se de uma abordagem rápida e de elevado valor preditivo para identificação de determinadas variantes. Em determinadas situações, esta abordagem não dispensa a sequenciação total do genoma viral; ii) Monitorização em tempo-real da "falha" na deteção do gene S.A "falha" na deteção do gene S (SGTF-S gene target failure) observada em alguns kits de diagnóstico por PCR em tempo real, a qual foi utilizada como critério laboratorial para identificar casos suspeitos de algumas variantes (nomeadamente Alpha e linhagens BA.1, BA.4 e BA.5 da Omicron).

Relatório disponível em: <https://insaflu.insa.pt/covid19/>

## Gripe e outros vírus respiratórios

A informação utilizada neste relatório e respetiva nota metodológica integram o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros Vírus Respiratórios publicado pelo INSA.

Boletim disponível [aqui](#).

Notas metodológicas disponíveis [aqui](#)

## SNS24

Os dados dos atendimentos triados pela Linha SNS24, o centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde, são obtidos a partir da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS), partilhados às quartas-feiras com a Direção-Geral da Saúde (DGS). Os dados são analisados de forma agregada por semana, desde a semana 21 de 2022, para os atendimentos totais e por algoritmo. Os algoritmos incluem “calor”, “queimaduras”, “exposição solar” e “náuseas e vômitos”. São ainda apresentados os atendimentos destes algoritmos por tipo de encaminhamento: “autocuidados”, “Cuidados de Saúde Primários”, “Instituto Nacional de Emergência Médica” (INEM) ou “Serviço de Urgência” (SU).

## Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)

Os dados são os disponibilizados diariamente pelo INEM, e correspondem às chamadas (total de chamadas recebidas do 112, chamadas de pedidos de triagem - provenientes dos Corpos de Bombeiros / Cruz Vermelha Portuguesa recebidas nas suas centrais e que são transferidas para os Centros de Orientação de Doentes Urgente, e chamadas recebidas da Linha SNS24), ocorrências (totais e por prioridade) e acionamentos de meios de emergência médica.

## Consultas dos Cuidados de Saúde Primários

A fonte de dados corresponde ao Sistema de Informação e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde (SIM@SNS), gerido pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS). Os dados são recolhidos e enviados pela SPMS à Direção-Geral da Saúde, que procede à análise dos mesmos.

Uma vez que os dados são consolidados mensalmente, poderá haver falhas nos carregamentos dos dados diários/semanais.

Os códigos da 2.ª edição da Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários (ICPC-2) incluídos nas infeções respiratórias agudas correspondem a: R29 (Sinal/sintoma do aparelho respiratório, outro); A77 (Outras doenças virais NE); R71 (Tosse convulsa); R72 (Infeção estreptocócica da orofaringe), R73 (Abscesso/furúnculo no nariz), R74 (Infeção aguda do aparelho respiratório superior); R75 (Sinusite crónica/aguda); R77 (Laringite/traqueíte aguda); R78 (Bronquite/bronquiolite aguda); R79 (Bronquite crónica); R80 (Gripe); R81 (Pneumonia); R82 (Pleurisia/derrame pleural); R83 (Infeção respiratória, outra) e R99 (Doença respiratória, outra).

Os códigos da ICPC-2 incluídos nas gastroenterites correspondem a D70 (Infeção gastrointestinal) e D73 (Gastroenterite, presumível infeção).

O código da ICPC-2 incluído na desidratação corresponde a T11 (Desidratação).

## Episódios de urgência hospitalar

A fonte de dados corresponde ao SIM@SNS, que passou a incluir desde 2023 a informação dos hospitais com o Sistema de Cuidados de Saúde Hospitalares (SONHO) e sem sistema SONHO. Os dados são recolhidos e enviados pela SPMS à DGS, que procede à análise dos mesmos.

A informação desagregada por grupo etário e com destino o internamento apenas integra hospitais com sistema SONHO.

O carregamento dos dados diários é consolidado no SIM@SNS mensalmente, pelo que poderão existir atualizações retrospectivas.

Esta informação é complementada com os dados reportados pelos hospitais na plataforma BI Hospitalar, que alimenta a plataforma Sistema de Dados Mestre (SDM), desenvolvida e gerida pela ACSS.

## Ocupação hospitalar camas em Enfermarias e camas em Unidade de Cuidados Intensivos

A fonte de dados corresponde à plataforma BI Hospitalar/SDM, a partir dos dados reportados pelos hospitais. Diariamente é possível consultar o número de camas disponíveis e ocupadas, para cada um dos hospitais do SNS que reportam dados para o BI Hospitalar.

## Mortalidade por todas as causas

A mortalidade por todas as causas usa como fonte de dados o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) da DGS. A metodologia para estimar a linha de base é uma adaptação do modelo proposto por Serfling, em que se usam dados desde 2007, retirando-se os períodos potencialmente associados a excessos de mortalidade já identificados no passado (epidemias de gripe, epidemia de COVID-19, períodos de frio ou de calor extremo). Os excessos de mortalidade são definidos como períodos em que a mortalidade está acima do limite superior do intervalo de confiança por duas ou mais semanas consecutivas ou acima do limite superior do intervalo de confiança a 99% por uma ou mais semanas consecutivas. Os dados do número absoluto de óbitos (certificados) por semana foram extraídos pelas 10h11 de 16-05-2024.

## Mortalidade específica por COVID-19

A mortalidade específica por COVID-19 usa como fonte de dados o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) da DGS. São considerados como óbitos por COVID-19, aqueles em que, após análise, a COVID-19 é considerada a causa básica de morte de acordo com regras definidas pela OMS.

O número de óbitos por COVID-19 observados a 7 e 14 dias por milhão de habitantes em Portugal resulta do quociente entre o número de óbitos devido à COVID-19 ocorridos no período em análise (numerador) e a população residente em Portugal, estimada a 31 de dezembro de 2021 (denominador) pelo INE.