



FEBRE HEMORRÁGICA DE MARBURGO Informação aos viajantes provenientes de Angola

Desde Outubro de 2004 que têm sido detectados casos de febre hemorrágica na província Angolana do Uíge. Em 21 de Março de 2005 foi identificado o vírus de Marburgo como o agente responsável por esta epidemia.

A febre hemorrágica de Marburgo é uma doença rara e mortal, em 25 a 80% das situações, tem um período médio de incubação de 2 a 9 dias, podendo prolongar-se até 21 dias.

As manifestações iniciais desta doença são: **febre elevada de início súbito, mal-estar, dores musculares e dores de cabeça, os quais são seguidos por dor de garganta, erupção cutânea, diarreia, dores abdominais, náuseas, vômitos e dores no peito.** Cinco a sete dias após o início destes sintomas, uma elevada proporção de doentes pode apresentar perdas de sangue através do nariz ou gengivas, pele, tubo digestivo (vômitos e diarreia com sangue), pulmões, rins e genitais.

Se esteve recentemente na província do **Uíge** ou teve **contacto directo**, sem protecção adequada, com:

- pessoa doente;
- órgãos ou produtos biológicos (sangue, urina, fezes, sémen, etc) de uma pessoa ou animal infectados por aquele vírus;
- qualquer material ou objectos utilizados no tratamento dos doentes;
- cadáveres durante a sua preparação e cerimónias fúnebres

deve vigiar o seu estado de saúde durante **21 dias após a estada ou último contacto**. Se sentir, dentro desse período, os sintomas acima referidos, contacte a **Linha Saúde Pública (808 211 311)**, relatando os sintomas e a viagem.



FEBRE HEMORRÁGICA DE MARBURGO Informação aos viajantes provenientes de Angola

Desde Outubro de 2004 que têm sido detectados casos de febre hemorrágica na província Angolana do Uíge. Em 21 de Março de 2005 foi identificado o vírus de Marburgo como o agente responsável por esta epidemia.

A febre hemorrágica de Marburgo é uma doença rara e mortal, em 25 a 80% das situações, tem um período médio de incubação de 2 a 9 dias, podendo prolongar-se até 21 dias.

As manifestações iniciais desta doença são: **febre elevada de início súbito, mal-estar, dores musculares e dores de cabeça, os quais são seguidos por dor de garganta, erupção cutânea, diarreia, dores abdominais, náuseas, vômitos e dores no peito.** Cinco a sete dias após o início destes sintomas, uma elevada proporção de doentes pode apresentar perdas de sangue através do nariz ou gengivas, pele, tubo digestivo (vômitos e diarreia com sangue), pulmões, rins e genitais.

Se esteve recentemente na província do **Uíge** ou teve **contacto directo**, sem protecção adequada, com:

- pessoa doente;
- órgãos ou produtos biológicos (sangue, urina, fezes, sémen, etc) de uma pessoa ou animal infectados por aquele vírus;
- qualquer material ou objectos utilizados no tratamento dos doentes;
- cadáveres durante a sua preparação e cerimónias fúnebres

deve vigiar o seu estado de saúde durante **21 dias após a estada ou último contacto**. Se sentir, dentro desse período, os sintomas acima referidos, contacte a **Linha Saúde Pública (808 211 311)**, relatando os sintomas e a viagem.