

PNV : ESQUEMA GERAL RECOMENDADO

Vacina/ Infeção-Doença	nascimento	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	5 anos	10 anos	25 anos	45 anos	65 anos	10/10 anos
VHB Hepatite B	VHB 1	VHB 2		VHB 3								
Hib infeção por Haemophilus influenzae b		Hib 1	Hib 2	Hib 3		Hib 4						
DTPa difteria, tétano, tosse convulsa		DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3		DTPa 4	DTPa 5					
VIP poliomielite		VIP 1	VIP 2	VIP 3		VIP 4	VIP 5					
Pn20 infeção por <i>Streptococcus pneumoniae</i>		Pn ₂₀ 1	Pn ₂₀ 2		Pn ₂₀ 3							
MenB infeção por <i>Neisseria meningitidis</i> B		MenB 1	MenB 2		MenB 3							
MenACWY <i>Neisseria meningitidis</i> ACWY					MenACWY							
VASPR sarampo, parotidite epidémica, rubéola					VASPR 1		VASPR 2					
HPV infeção por vírus do papiloma humano								HPV 1,2				
Tétano, difteria e tosse convulsa									Tdpa - Grávidas			
Tétano e difteria								Td	Td	Td	Td	Td

Legenda:

Vacinas em blocos interligados por traços de cor – vacinas com antígenos para todas as doenças evitáveis mencionadas no interior dos limites: a vacina hexavalente (2 meses e 6 meses) inclui VHB; Hib; DTPa e VIP, a vacina pentavalente (4 meses e 18 meses) inclui Hib, DTPa e VIP, e a vacina tetravalente (5 anos) inclui DTPa e VIP;

Número – número de dose no esquema geral recomendado para cada doença.

Notas ao Quadro: ESQUEMA GERAL RECOMENDADO

VHB	A vacinação ao nascimento, deve ser administrada nas primeiras 24 horas de vida , na maternidade. Quando tal não ocorrer, deve ser administrada o mais brevemente possível no período neonatal, como por exemplo, aquando do rastreio de doenças metabólicas.
Hib	Crianças que tiveram doença invasiva por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b antes dos 2 anos de idade podem e devem iniciar ou completar o esquema vacinal da Hib ≥ 1 mês após o início da doença, até ao dia antes de fazerem 5 anos de idade, de acordo com o esquema vacinal recomendado para a sua idade.
DTPa	As crianças de qualquer idade que tiveram tosse convulsa podem e devem ser vacinadas após a cura, iniciando ou completando os esquemas recomendados para a sua idade, uma vez que a doença pode não induzir imunidade duradoura.
Pn20	Quando a 1ª dose for administrada antes dos 6 meses de idade, como recomendado, a 3ª dose pode ser administrada a partir dos 11 meses de idade. Crianças que tenham iniciado o esquema universal com a vacina Pn13, deverão completá-lo com a vacina Pn20. As crianças que tiveram doença invasiva pneumocócica em qualquer idade, devem iniciar ou completar o esquema vacinal da Pn20 ≥ 1 mês após o início da doença, até ao dia antes de fazerem 5 anos de idade.
MenB	Aplicável aos nascidos ≥ 2019 . As crianças que iniciaram a vacinação por prescrição médica podem completar o esquema no âmbito do PNV, até ao dia antes de fazerem 5 anos de idade, respeitando o esquema recomendado para a sua idade. Crianças que tiveram doença invasiva por <i>Neisseria meningitidis</i> B antes dos 2 anos de idade podem e devem iniciar ou completar o esquema vacinal da MenB ≥ 1 mês após o início da doença, até ao dia antes de fazerem 5 anos de idade, de acordo com o esquema vacinal recomendado para a sua idade.
MenACWY	As crianças com ≥ 12 meses e < 18 anos de idade que não cumpriram o esquema geral recomendado com a vacina MenC aos 12 meses de idade, devem ser vacinadas com MenACWY na primeira oportunidade ou contacto com os serviços de saúde. Crianças que tiveram doença invasiva por <i>Neisseria meningitidis</i> dos serogrupos A, C, W ou Y antes dos 2 anos de idade podem e devem ser vacinadas com MenACWY ≥ 1 mês após o início da doença, até ao dia antes de fazerem 18 anos de idade.
HPV	Aplicável ao sexo feminino e masculino, se nascidos ≥ 2009 , com o esquema 0, 6 meses.
Tdpa	Aplicável a grávidas, com o objetivo de proteger passivamente o recém-nascido e o lactente contra a tosse convulsa, nas primeiras semanas de vida. Administrar entre as 20 e as 36 semanas de gestação, após a ecografia morfológica (recomendada entre as 20 e as 22 semanas + 6 dias) e, idealmente, até às 32 semanas. A idade gestacional é comprovada através de apresentação do Boletim de Saúde da Grávida, de declaração médica ou por consulta da informação clínica. Dose única em cada gravidez, independentemente de história anterior da doença e do estado vacinal.
Td	De acordo com a idade, devem ser aplicados os intervalos recomendados entre doses, tendo como referência a data de administração da dose anterior. A partir dos 65 anos de idade, recomenda-se a vacinação se a última dose de Td tiver ocorrido há ≥ 10 anos; as doses seguintes são administradas de 10 em 10 anos.