

## PNV : VACINAS RECOMENDADAS A ADULTOS (≥18 ANOS DE IDADE)

Vacina/ Infeção-Doença	25 anos	45 anos	65 anos	10/10 anos	Grupos de risco	Anualmente
Tdpa   tétano, difteria e tosse convulsa	Tdpa - Grávidas					
Td  Tétano e difteria	Td	Td	Td	Td		
Gripe						Gripe (ver capítulo específico)
VGZ   Gripe zoonótica					VGZ (ver capítulo específico)	
COVID -19						COVID-19 (ver capítulo específico)
Pn20 e Pn23   <i>Streptococcus pneumoniae</i>			Pn23 (ver capítulo específico)		Pn20+Pn23 (ver capítulo específico)	
MVA-BN   mpox					MVA-BN (ver capítulo específico)	
VHA   hepatite A					VHA (ver capítulo específico)	
VHB   hepatite B					VHB (ver capítulo específico)	
VIP   poliomielite					VIP (ver capítulo específico)	
VASPR   sarampo, parotidite epidémica e rubéola					VASPR (ver capítulo específico)	

## Notas ao Quadro: VACINAS RECOMENDADAS A ADULTOS (≥18 ANOS DE IDADE)

1. Os adultos que nunca foram vacinados contra o **tétano e difteria**, cujo estado vacinal se desconheça ou com a primovacinação incompleta, devem ser vacinados até completarem 3 doses de **Td** (primovacinação), recomendando-se um intervalo de 4 a 6 semanas entre a primeira e a segunda doses, de 6 a 12 meses entre a segunda e a terceira doses e a continuação dos reforços, ao longo da vida.
2. Para os reforços da Td, devem ser aplicados os intervalos recomendados entre doses, de acordo com a idade, tendo como referência a data de administração da dose anterior. Em esquemas atualizados com ≥18 anos de idade, a dose seguinte deve ser administrada com um intervalo de 20 anos. A partir dos 65 anos de idade, recomenda-se a vacinação de todas as pessoas que tenham feito a última dose de Td há ≥10 anos e as doses seguintes são administradas de 10 em 10 anos.
3. Os adultos nascidos ≥1970, sem história credível de **sarampo**, que nunca foram vacinados contra o sarampo ou com estado vacinal desconhecido, devem ser vacinados com 1 dose de **VASPR**. No caso de profissionais de saúde que têm contacto próximo com doentes em contexto de serviços de saúde, estão recomendadas 2 doses, independentemente do ano de nascimento.
4. Em adultos com risco acrescido de exposição ao vírus da **poliomielite**, o esquema da **VIP** pode ser iniciado ou completado em qualquer idade, num esquema de 3 doses, cumprindo os intervalos mínimos recomendados.
5. Poderão estar, ainda, recomendadas outras vacinas a adultos em situações específicas ou se pertencentes a grupos de risco. Para mais informação a este respeito, deverão ser consultados os capítulos específicos de cada doença e/ou o capítulo – Vacinação em situações especiais.