



Vacina/ doença-Infeção	1ª visita	4 semanas após a dose anterior	6 meses de idade após a dose anterior	1-2 meses após a dose anterior	4 semanas após a dose anterior	Tdpa/Td 1	Td 1	Td 2	Td 3	Td 4	Td 5	VHB hepatite B ^a	VIP poliomielite	MenACWY infecção por <i>Neisseria meningitidis</i> serogrupos A, C, W e Y ^e	VASPR sarampo, parotidite epidémica e rubéola	HPV infecção por vírus do papiloma humano ^b	Pessoa imunocom- prometida ^c
VHB hepatite B ^a	VHB 1	VHB 2	-	-	VHB 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIP poliomielite ^d	VIP 1	VIP 2	-	-	VIP 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MenACWY infecção por <i>Neisseria meningitidis</i> serogrupos A, C, W e Y ^e	MenACWY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VASPR sarampo, parotidite epidémica e rubéola	VASPR 1	-	-	-	VASPR 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HPV infecção por vírus do papiloma humano ^b	HPV 1	-	-	-	HPV 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa imunocom- prometida ^c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esquema vacinal tardio para crianças e jovens com idade igual ou superior a 7 anos

Esquema vacinal em atraso para crianças com idade igual ou superior a 3 meses e inferior a 7

Vacina/ doença-Infeção	1ª visita	4 semanas após a dose anterior	6 meses de idade após a dose anterior	18 meses de idade ou 6 meses após a dose anterior	5 anos de idade ou 6 meses após a dose anterior
VHB hepatite B ^a	VHB 1	VHB 2		VHB 3	
Hib infecção por <i>Haemophilus influenzae</i> b ^b	Hib 1	Consultar Quadro nº 2			
DTPa difteria, tétano, tosse convulsa ^a	DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3	DTPa 4	DTPa 5
VIP poliomielite ^d	VIP 1	VIP2	VIP3	VIP4	VIP5
Pn20 infecção por <i>Streptococcus pneumoniae</i> ^e	Pn20	Consultar Quadro nº 3			
MenB infecção por <i>Neisseria meningitidis</i> serogrupo B ^f	MenB	Consultar Quadro nº 4			
MenACWY <i>Neisseria meningitidis</i> serogrupos A, C, W e Y ^g	MenACWY	-	-	-	-
VASPR sarampo, parotidite epidémica e rubéola ^h	VASPR 1	-	-		VASPR 2