



Ministério da Saúde



# PNV 2006

## VACINAÇÃO UNIVERSAL – ESQUEMA RECOMENDADO CRONOLOGIA E LOCAIS DE ADMINISTRAÇÃO

- ATÉ 12 MESES DE IDADE -

Nascimento		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses	
Vacina(s)	Local(ais) de administração	Vacina(s)	Local(ais) de administração	Vacina(s)	Local(ais) de administração	Vacina(s)	Local(ais) de administração	Vacina(s)	Local(ais) de administração	Vacina(s)	Local(ais) de administração
<b>BCG</b> <i>BCG SSI</i>	Entre a zona superior do terço médio e o terço superior (acima da inserção distal do músculo deltóide), na face postero-externa do <b>braço esquerdo</b>  <i>inj. Intradérmica</i>	<b>DTPa</b> <b>VIPHib 1</b> <i>Pentavac;</i> <i>Infanrix IPV-Hib</i>	Músculo vasto externo, na face externa da região antero-lateral da <b>coxa esquerda</b>  <i>inj. Intramuscular</i>	<b>MenC 1</b> <i>MenjugateKit;</i> <i>Neisvac-C</i>	Músculo vasto externo, na face externa da região antero-lateral da <b>coxa esquerda</b>  <i>inj. Intramuscular</i>	<b>DTPa</b> <b>VIPHib 2</b> <i>Pentavac;</i> <i>Infanrix IPV-Hib</i>	Músculo vasto externo, na face externa da região antero-lateral da <b>coxa esquerda</b>  <i>inj. Intramuscular</i>	<b>MenC 2</b> <i>MenjugateKit;</i> <i>Neisvac-C</i>	Músculo vasto externo, na face externa da região antero-lateral da <b>coxa esquerda</b>  <i>inj. Intramuscular</i>	<b>DTPa</b> <b>VIPHib 3</b> <i>Pentavac;</i> <i>Infanrix IPV-Hib</i>	Músculo vasto externo, na face externa da região antero-lateral da <b>coxa esquerda</b>  <i>inj. Intramuscular</i>
<b>VHB 1</b> <i>Engerix B</i>	Músculo vasto externo, na face externa da região antero-lateral da <b>coxa direita</b>  <i>inj. Intramuscular</i>	<b>VHB 2</b> <i>Engerix B</i>	Músculo vasto externo, na face externa da região antero-lateral da <b>coxa direita</b>  <i>inj. Intramuscular</i>							<b>VHB 3</b> <i>Engerix B</i>	Músculo vasto externo, na face externa da região antero-lateral da <b>coxa direita</b>  <i>inj. Intramuscular</i>