

FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DO USO DE LUVAS NAS UNIDADES DE SAÚDE

ARS _____	Cidade _____	Unidade de Saúde _____
Observador _____	Período N.º _____	Serviço/Departamento _____
Data (dd.mm.aaaa) _____	Sessão N.º _____	Enfermaria _____
Hora de início/fim (hh:mm) _____	Formulár. N.º _____	
Duração da sessão (mm) _____		

SELEÇÃO/COLOCAÇÃO DAS LUVAS	Cat. Profissional			Cat. Profissional			Cat. Profissional			Cat. Profissional			Cat. Profissional		
	Ação			Ação			Ação			Ação			Ação		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1 - Seleciona as luvas adequadas ao procedimento															
2 - Higieniza as mãos antes de colocar as luvas															
3 - Coloca as luvas imediatamente antes de iniciar o procedimento															
4 - Coloca as luvas com técnica adequada garantindo a sua não contaminação															
5 - Utiliza duplo par de luvas em situação de risco particularmente elevado ¹															
6 - Utiliza luvas de punho alto e/ou cobre a bata com a luva em situação de elevado risco de exposição a fluidos orgânicos ²															
USO/SUBSTITUIÇÃO DAS LUVAS	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
7 - Utiliza luvas limpas descartáveis na exposição direta ³															
8-Utiliza luvas limpas descartáveis na exposição indireta ⁴															
9 - Utiliza luvas esterilizadas em procedimento invasivo/cirúrgico															
10 - Utiliza luvas reutilizáveis de uso individual em procedimento de descontaminação ambiental/DM															
11- Troca de luvas entre procedimentos no mesmo doente															
12- Retira as luvas após o procedimento															
13- Toca no ambiente envolvente (superfícies, materiais e equipamentos) sem luvas ⁵															
REMOÇÃO DAS LUVAS	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
14 – Remove as luvas com técnica adequada, prevenindo a sua contaminação e do ambiente															
15- Remove as luvas pela ordem indicada ⁶ , quando utilizadas conjuntamente com outros EPIs															
16- Descarta as luvas de acordo com a norma interna de triagem dos resíduos															
17- Higieniza as mãos imediatamente após a remoção das luvas															

¹ Usar duplo par de luvas em situações de risco particularmente elevado ou alta probabilidade de perfuração e/ou exposição a fluidos orgânicos, como por exemplo em procedimentos cirúrgicos ortopédicos.

² Usar luvas de punho alto para cobrir o antebraço nos procedimentos com exposição a grandes quantidades de fluidos orgânicos ou sangue, como por exemplo no caso de partos vaginais.


³ Exposição direta ao utente: Contacto com sangue ou outros fluidos orgânicos, com exceção do suor, contacto com mucosas, contacto com pele não íntegra, higiene oral, higiene perineo entre outros contactos com risco acrescido de infeção/microorganismos patogénicos.

⁴ Exposição indireta ao utente: Manipulação/limpeza de superfícies e instrumentos contaminados, limpeza e remoção segura de derrames e salpicos de sangue e outros fluidos orgânicos, esvaziamento de recipientes de fluidos orgânicos, manipulação de resíduos, etc.

⁵ Constitui exceção a esta situação o doente em isolamento por contacto.

⁶ 1º Luvas, 2º bata, 3º higiene das mãos, 4º proteção ocular, 5º respirador/máscara, 6º higiene das mãos.

Indicações para o uso de luvas – Pirâmide da OMS



Fonte: Traduzido e adaptado de OMS: "Glove Use Information Leaflet". Patient Safety, a World Alliance for Safer Health care. 2009.