

**Algoritmo: Avaliação do risco de infecção e aplicação de medidas de contenção e de protecção:**

<b>Patologias usuais</b>	PBCI Todas, incluindo: Herpes Zoster localizado; Herpes Simples; HIV; Hepatites	<b>Bactérias MMR; Pediculose; escabiose; Diarreia por <i>Clostridium difficile</i>; Diarreia na Pediatría; Infecções extensas</b>	<b>Tuberculose; Sarampo</b>	<b>Varicela; Herpes Zoster (disseminado ou em doente imunossuprimido)</b>	<b>Meningite bacteriana; Rubéola; Papeira</b>	<b>&lt; 500 neutrófilos; Queimaduras extensas não infetadas</b>
<b>Tipo de Precauções</b>	<b>PBCI</b>	<b>Contacto</b>	<b>Via Aérea</b>	<b>Contacto + Via Aérea</b>	<b>Gotículas</b>	<b>Doente Imunossuprimido</b>
<b>Quarto</b>	Comum	Individual Comum Portas fechadas	Obrigatório; Portas e janelas fechadas.	Obrigatório; Portas e janelas fechadas.	Individual Comum Portas fechadas	Individual Comum Portas fechadas
<b>Luvas</b>	Risco de contacto com sangue e outras secreções e excreções	Sempre que entrar no quarto; Retirar antes de sair do quarto	PBCI	Sempre que entrar no quarto; Retirar antes de sair do quarto	PBCI	PBCI
<b>Avental</b>	Risco de contaminação da farda com sangue e outra matéria orgânica	Ao entrar no quarto	PBCI	Ao entrar no quarto	PBCI	PBCI
<b>Máscara</b>	Risco de salpicos de sangue e outra matéria orgânica para as mucosas oral, nasal e ocular (adicionar protector ocular)	PBCI	Para não imunes à patologia M. <sup>a</sup> Especial (N95); Colocar e remover na antecâmara.	Para não imunes à patologia M. <sup>a</sup> Especial (N95); Colocar e remover na antecâmara.	Para não imunes à patologia: M. <sup>a</sup> Cirúrgica; Colocar ao entrar no quarto.	PBCI
<b>Higiene das Mãos</b>	Sabão líquido/SABA	Sabão líquido/SABA	Sabão líquido/SABA	Sabão líquido/SABA	Sabão líquido/SABA	Sabão líquido/SABA
<b>Deambulação</b>	Sem restrição	Limitar; Se necessário, proteger lesões e conter drenagens; O profissional deve usar luvas e avental	Evitar; Se necessário, colocar máscara cirúrgica no doente.	Proibida	Evitar; Se necessário, colocar máscara cirúrgica no doente.	Evitar; Na TMO, colocar máscara com filtro HEPA no doente.
<b>Transporte do doente</b>	Sem restrição	Limitar; Se necessário, proteger lesões e conter drenagens.	Evitar; Se necessário, colocar máscara cirúrgica no doente	Evitar; Se necessário, colocar máscara cirúrgica no doente e protegê-lo com lençol.	Evitar; Se necessário, colocar máscara cirúrgica no doente.	Evitar; Na TMO, colocar máscara com filtro HEPA no doente.

Fonte: Adaptado de: Enf.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Valeska Stempluk-IEP(HSL. Hospital SírioLibanês: “Precauções padrão e Isolamento”.

